


FECAVA Priporočila za odgovorno uporabo protimikrobnih sredstev

Kdaj naj uporabim protimikrobno sredstvo pri pacientu?

Uporabi tabelo pri :

- podpori pri odločanju
- izogibanju nepotrebnim uporabi protimikrobnih sredstev



Kdaj so sistemska protimikrobna sredstva navadno nepotrebna?

“Preventivna uporaba” pri zdravih živalih

- Rutinska dentalna higiena
- Zdravljenje klinično zdravih živali, ki so bile v stiku z obolelo
- Pred paritvijo /v času dojenja

Kirurgija zdravega / neokuženega tkiva

- Rutinske kastracije in sterilizacije
- Rutinska laparotomija
- Carski rez
- Odstranitev neinficiranih tumorjev
- Čista, kratkotrajna ortopedska kirurgija (< 1,5 h)
- Nevrokirurgija
- Rekonstrukcijska kirurgija, otoplastika, kožni režnji itd

Nezapletena stanja znane ali sumljive virusne etiologije

- Akutni kašelj pri psih
- Akutna gastrointestinalna infekcija
- Mačja virusna infekcija zgornjih dihal
- Mačji kalici virus
- FeLV / FIV
- Rinitis

Druga stanja brez vpletenosti patogenih bakterij

- Bolezen spodnjih sečil pri mačkah (FLUTD)
- Juvenilni vaginitis
- Akutni konjunktivitis
- Kronični bronhitis
- IBD
- Hiperplazija prostate ali ciste na prostati
- Analne žleze: vnetje/povečanje brez abscediranja
- Rane z zdravim granulacijskim tkivom

Stanja, ki se dobro odzovejo na antiseptike ali druga topikalna sredstva

- Nezahtevne kožne spremembe ali blago vnetje ran in ugrizov
- Površinsko gnojno vnetje kože
- Seboroična vnetja kože
- Otitis eksterna
- Parodontalna bolezen

Druga netežavna stanja z bakterijsko etiologijo

- Ugrizne rane pri mačkah
- *Salmonella* gastroenteritis
- *Campylobacter* spp gastroenteritis
- *Clostridium difficile* gastroenteritis

Tabela je vzorčna in ne zajema vseh možnosti.